



SAMS

إرشادات ما بعد الجراحه

1. تجنب الأكل و الشرب إلى أن يزول مفعول المخدر الموضعي.
2. تجنب الأكل و الشراب الحار لمدة 24 ساعه من الجراحه.
3. تجنب الأطعمه القاسيه و اللزجه في مكان الجراحه و يفضل الأكل في الجهة الأخرى.
4. تجنب التدخين لمدة أسبوع مع التقليل من عدد السجائر تدريجياً لتجنب مضاره على اللثه و الصحه العامه.
5. أخذ حبة مسكن قبل أن يزول مفعول المخدر.
6. في حال وصف الطبيب لمضاد حيوبي يؤخذ العلاج كاملاً حسب إرشادات الطبيب.
7. تجنب أخذ دواء الأسبرين يوم الجراحه.
8. استخدام الماء الدافئ و الملح للمضمضة ابتداء من اليوم الثالث.
9. استخدام غسول الكلورو هيكسيدين مرتين في اليوم مع مراعاة تنظيف الأسنان جيداً قبل استخدام الغسول لتقليل نسبة حدوث إصفرار الاسنان.
10. في حال وصف الطبيب المعالج جل الكلورو هيكسيدين يوضع في منطقة الجراحه مرتين في اليوم مع تجنب الأكل او الشرب لمدة نصف ساعه.
11. توضع كمادات ثلج خارجيه جهة الجراحه من اليوم الأول والثاني للتقليل من نسبة حدوث انتفاخ.
12. تستخد فرشاة الأسنان من اليوم الأول مع مراعاة تجنب منطقة الجراحه.
13. مراعاة صحة و نظافة الفم و الأسنان تساعد على إلتئام الجرح و يمنع التهاب المنطقة.
14. في حالة نزيف الدم يتم الضغط على مكان النزيف لمدة 10 دقائق بالشاش او بمنديل قطني نظيف مع تجنب المضمضة لحين وقوف النزيف، وفي حالة استمرار النزيف بشكل وكمية غير طبيعية يرجى الإتصال على الطبيب المعالج فوراً.
15. في حالة ظهور انتفاخ أو ألم مفاجئ بعد مرور ثلاثة أيام يرجى مراجعة الطبيب المعالج.
16. في حالة استخدام الغرز يراجع الطبيب بعد أسبوع لإزالة الغرز.